


Orientation diagnostique devant un TRAUMATISME de l'ÉPAULE et conduite à tenir en situation d'urgence

AVENTIS INTERNAT EST DIRIGÉ PAR : WILLIAM BERREBI, PATRICK GEPNER, JEAN NAU



- Chute sur la main
- Coude en extension
- Chez un enfant de 4 à 10 ans

➔ GROS COUDE DOULOUREUX ➔

RECHERCHER UNE COMPLICATION IMMÉDIATE

- Pouls radial
- Motricité et sensibilité des doigts (médian, radial)
- Etat cutané

BILAN RADIOGRAPHIQUE**CLASSIFICATION**

- Fracture supra-condylienne (FSC)
- Fracture - du condyle externe
- de l'épitrôchlée
- Fractures rares :
 - sus et intercondylienne
 - de l'épicondyle
 - du condyle interne
 - diacondylienne
 - du capitellum

Visualisation du TRAIT

Métaphysaire huméral inférieur
= fracture supracondylienne (FSC)

Evaluation du DEPLACEMENT (FCS)

le plus souvent en extension

- Stade I : non déplacé
- Stade II : petite bascule postérieure
- Stade III : décalage + rotation
- Stade IV : perte de tout contact entre les 2 fragments

PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES

- Urgence thérapeutique
- Réduire parfaitement (pas de remodelage de croissance à ce niveau)
- Méthode thérapeutique fonction du déplacement (plâtre, méthode de Blount, broches percutanées, chirurgie) :
 - Stade I : immobilisation BABP 1 mois
 - Stade II : réduction orthopédique + contention par plâtre en flexion du coude ou en bandage de BLOUNT
 - Stade III : méthode de BLOUNT ou double brochage percutané par voie latérale (technique de JUDET)
 - Stade IV : - réduction orthopédique + brochage si possible
- réduction chirurgicale + ostéosynthèse dans les autres cas
- Surveiller les doigts si plâtre
- Consolidation : 1 mois environ
- Pas de rééducation

RECHERCHER UNE COMPLICATION ÉVENTUELLE


- SECONDAIRE :
 - Déplacement secondaire
 - Syndrome de Volkmann +++
 - Infection post-opératoire
- TARDIVE :
 - Cal vicieux ➔ désaxations (cubitus varus plus fréquent que valgus)
 - Ostéome ➔ raideur

FRACTURE de L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE du RADIUS chez l'ADULTE

Mécanisme, diagnostic, traitement

Dr E. MASMEJEAN
Chirurgie orthopédique
Hôpital Bichat, Paris

AVENTIS INTERNAT EST DIRIGÉ PAR : WILLIAM BERREBI, PATRICK GEPNER, JEAN NAU



LASILIX[®] 20 mg/2 ml
EUROSEMIOF
Solution injectable en ampoule

Diurétique de l'Anse • Œdème aigu du poumon


Mentions légales :
cliquez sur le
nom du produit

FRACTURE de L'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE du FÉMUR chez l'ADULTE

Étiologie, mécanisme, diagnostic, évolution, traitement


AVENTIS INTERNAT EST DIRIGÉ PAR : WILLIAM BERREBI, PATRICK GEPNER, JEAN NAU



Dr V. GLEIZES
Chirurgie orthopédique
Hôpital Raymond Poincaré,
Garches



FRACTURE DE JAMBE**Mécanisme, diagnostic, traitement**

AVENTIS INTERNAT EST DIRIGÉ PAR : WILLIAM BERREBI, PATRICK GEPNER, JEAN NAU

DOULEUR + DÉFORMATION + IMPOTENCE FONCTIONNELLE



ENTORSES DE LA CHEVILLE

Diagnostic, conduite à tenir en situation d'urgence

Dr V. GLEIZES
Chirurgie orthopédique
Hôpital Raymond Poincaré,
Garches

AVANTIS INTERNAT ARI BIRINE RAB WILLIAM BAKKARI PATRICK GARNIER JUAN NAL



40 mg
et 100 mg


**CANCERS COLORECTAUX AVANCÉS EN 1^{re} LIGNE
EN ASSOCIATION AVEC LE 5FU-AF**

Mancini Wasson
Chirurgie oncologique
Hôpital Raymond Poincaré

www.mancini.com

FRACTURE BIMALLÉOLAIRE CHEZ L'ADULTE**Mécanisme, diagnostic, traitement**

AVENTIS INTERNAT EST DIRIGÉ PAR : WILLIAM BERREBI, PATRICK GEPNER, JEAN NAU

Dr V. GLEIZES
Chirurgie orthopédique
Hôpital Raymond Poincaré,
Garches**IKOREL®**
nicorandilnicorandil 10 mg et 20 mg
Activateur des canaux potassiques**Traitement prophylactique
de la crise d'angor d'effort**Mentions légales :
cliquez sur le
nom du produit

Contexte d'accident avec (poly)traumatisme :

- signes neurologiques
- douleurs rachidiennes

TRAUMATISME DU RACHIS

jusqu'à preuve du contraire

- Minerve rigide + matelas coquille
- Déplacement du blessé "en bloc" avec décubitus dorsal strict, traction douce dans l'axe du corps (plusieurs personnes)

LÉSION ASSOCIÉE ?

- Hémodynamique
- Fonction ventilatoire
- Troubles de la vigilance

EXAMEN NEUROLOGIQUE

- Motricité/sensibilité
- ROT/RCP
- Signes périnéaux : sensibilité périnéale, contraction du sphincter anal, réflexe bulbocaverneux, rétention aiguë d'urine

- **NIVEAU** de l'atteinte neurologique
- Caractère **COMPLÉT** ou non de la lésion

IMAGERIE

- Clichés standards F + P (+ incidence C1C2 bouche ouverte et 2 trois-quart pour le rachis cervical) dégageant bien les charnières (cervicodorsale et dorsolumbaire) ± clichés dynamiques (en cervical)
- Scanner et/ou IRM pour recherche de lésions osseuses et discoligamentaires

**INSTABILITÉ ?
⇒ risque médullaire ?****LÉSION INSTABLE**CERVICALE

- Entorse grave
- Fracture odontoidienne
- Fracture de JEFFERSON
- Fracture-luxation d'1 ou de 2 massifs articulaires

THORACO-LOMBAIRE

- Fracture communitive ou par compression axiale (burst fracture)
- Fracture par distraction
- Fracture par flexion ou torsion

CHIRURGIE

le plus souvent

LÉSION STABLECERVICALE


- Entorse bénigne
- Fracture isolée de l'arc de C1

THORACO-LOMBAIRE

- Fracture tassement par compression antérieure
- Fracture isolée d'une transverse ou d'une épineuse

**TRAITEMENT
ORTHOPÉDIQUE**


le plus souvent



PLAIES DE LA MAIN

Diagnostic, traitement dans les vingt-quatre premières heures

AVENTIS INTERNAT EST DIRIGÉ PAR : WILLIAM BERREBI, PATRICK GEPNER, JEAN NAU


Dr E. MASMEJEAN
Chirurgie orthopédique
Hôpital Bichat, Paris

PANARIS ET PHLEGMON DES GAINES

Diagnostic, évolution, traitement

Dr E. MASMEJEAN
Chirurgie orthopédique
Hôpital Bichat, Paris

AVENTIS INTERNAT EST DIRIGÉ PAR : WILLIAM BERREBI, PATRICK GEPNER, JEAN NAU



LASILIX® FAIBLE 20 mg

LASILIX® 40 mg comprimés

Diurétique
de l'Anse


- Œdème d'origine cardiaque ou rénale
- Œdème d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur potassique
- Hypertension artérielle

Mentions légales :
cliquez sur le
nom du produit

BRÛLURES**Étiologie, physiopathologie, diagnostic, conduite à tenir en situation d'urgence**

AVENTIS INTERNAT EST DIRIGÉ PAR : WILLIAM BERREBI, PATRICK GEPNER, JEAN NAU

Dr V. GLEIZES

Chirurgie orthopédique
Hôpital Raymond Poincaré,
Garches**Imovane®**

Zopiclone 7,5 mg - comprimé pelliculé sécable

INSOMNIES OCCASIONNELLE, TRANSITOIRE ET CHRONIQUEMentions légales :
cliquez sur le
nom du produit